













LEGENDA

ALL1 alluvioni recenti e attuali del Fiume Sabato costituite da sabbie e ghiaie calcaree da subangolari a subarrotondate in matrice terrosa grigia (attuale);

PIR1 copertura piroclastica dei rilievi: piroclastiti da caduta in giacitura primaria, formate da cineriti con livelli di pomici e minuscole scorie inglobate, a copertura delle paleosuperfici e spianate carsiche dei rilievi calcarei (Olocene);

PIR2 copertura piroclastica pedemontana formata da cineriti con livelli di pomici e minuscole scorie inglobate, generalmente da caduta in giacitura primaria oppure poco rimaneggiata nei pressi dei rilievi calcarei (Olocene);

CO1 deposito di conoide formato, nella parte apicale, da detrito calcareo arrotondato con matrice terrosa piroclastica variabile e, nella parte distale, da piroclastiti limo-sabbiose con pomici disperse (Olocene);

CO2 deposito di conoide formato da conglomerati calcarei ben arrotondati, talora massivi, con matrice terrosa piroclastica variabile (Olocene);

GH talus pedemontano dei rilievi calcarei costituito da brecce calcaree eterometriche, talora legate da cementazione spatica secondaria, con ridotta matrice terrosa piroclastica che tende ad aumentare nelle zone più distali (Quaternario);

SA talus pedemontano dei rilievi arenaceo-argillosi costituito da misture variabili di sabbie ed argille con radi frammenti litoidi angolari arenacei, calcarenitici e marnosi (Quaternario);

ALL2 deposito alluvionale antico del F. Sabato formato da ghiaie eterometriche calcareo-marnose ed arenacee alternate a strati e banchi di limi sabbiosi ed argillosi (Pleistocene sup. - Olocene);

FL1 Formazione di Castelvetere (membro arenaceo-conglomeratico): successione di arenarie quarzoso-feldspatiche e quarzoso-litiche e subordinatamente micacee a grana medio-grossa intercalate con calcari, calcari marnosi e conglomerati poligenici e con orizzonti di argille e siltiti (Miocene);

FL2 Formazione di Corleto Perticara: successione di calcari marnosi e marne calcaree giallognole, bianche, grigie e verde chiaro, calciluttiti bianche, marne sfaldabili bianche e rosa con laminazione piano-parallela, argille e argille marnose laminate verde, grigio scuro e marrone (Cretacico sup. - Miocene inf.);

Successione carbonatica dei M.ti Lattari - M.ti Picentini:

C1 calcari e calcari dolomitici grigio chiaro, biancastri o avana con frequenti intercalazioni di dolomie grigie e calcari clastici (Cretaceo superiore);


C2 dolomie cristalline grigie alternate a calcari avana e grigi, con alla base livelli conglomeratici in matrice marnosa verdastra - Cretaceo inferiore;

C3 calcari e calcari dolomitici grigi, biancastri o avana alternati a dolomie cristalline grigie laminate più frequenti nella parte alta (Giurassico superiore - Cretaceo inferiore);

faglia principale;

faglia o frattura secondaria;

Comune di Serino
(provincia di Avellino)



Studio geologico del P.U.C. con adeguamento al P.A.I.

L.R. 9/1983 e s.m.i - D.P.R. 380/2001 - L.R. 16/2004 e s.m.i.

tavola 3	*Sezioni geolitologiche*	scala: 1: 5'000
		novembre 2022

Firmato digitalmente da
VITO PELOSI
CN = VITO PELOSI
C = IT

Sindaco
avv. Vito Pelosi

I GEOLOGI
LUCA GUARINO
12.03.2026 13:53:14 GMT+01:00
dr. Luca Guarino

dr. Giuseppe Gallo

Respondabile del Procedimento
arch. Valentina Gagliardo

IL CONSULENTE GEOLOGICO
dr. Angelo Miranda

architetto PIERRO GAMBERO ORDINE ARCHITETTI PPC PROVINCIA AVELLINO 1200229304d9 09.03.2026 12:35:16 GMT+01:00